Estado nutricional en pacientes con cáncer de próstata Centro Oncológico Territorial Holguín 2019 - 2020

1. Richard Garib Hernández[1] https://orcid.org/0000-0003-1689-8145
2. Zulma Hechavarría Del Río[2] https://orcid.org/0000-0003-0318-0388

[1]Facultad de Ciencias Médicas "Mariana Grajales Coello". Universidad de Ciencias Médicas de Holguín, Cuba. Informática.

[2]Facultad de Ciencias Médicas "Mariana Grajales Coello". Universidad de Ciencias Médicas de Holguín, Cuba. Ciencias Básicas.

INTRODUCCIÓN

Incremento de la esperanza de vida.

Exposición prolongada a factores de riesgo

Aumento de la incidencia de ECNT entre ellas el cáncer.

Cáncer de próstata el más frecuente en el sexo masculino.

Es la segunda causa de muerte en los varones en el mundo (más de 300000 fallecidos por año) y en Cuba (3140 fallecimientos en el 2019).

Stress, tipo de tumor, tratamiento y cambios metabólicos propios del proceso neoplásico.

Trastornos Nutricionales en el paciente oncológico.

Actuación nutricional temprana.

.

MÉTODO

Se realizó un estudio cuantitativo descriptivo de serie de casos, en una muestra de 75 pacientes con el diagnóstico de cáncer de próstata en estadios T3 y T4 en el centro oncológico territorial de Holguín de Enero 2019 a Diciembre 2020, con el objetivo de caracterizar su estado nutricional, para lo cual se evaluaron variables de dimensión sociodemográfica y biomédica, se utilizaron métodos empíricos, teóricos y estadísticos.

CONCLUSIONES

El grupo de edad de mayor prevalencia fue entre 70 y 79 años, así como el hábito de fumar y los antecedentes familiares de cáncer de cualquier localización fueron los factores de riesgo más frecuentes.

La mayor frecuencia de valores patológicos de los indicadores bioquímicos, la mostraron los triglicéridos.

Existió un predominio de los pacientes con valoración nutricional de normopeso y en riesgo de malnutrición.

RESULTADOS



Comportamiento de la edad en los pacientes del estudio





Presencia de los factores de riesgo seleccionados.



Valores de colesterol y triglicéridos en los pacientes estudiados.



Valoración Nutricional según los resultados de la *Mini Nutritional Assessment* (MNA) en los pacientes estudiados.